

Informovaný souhlas pacienta s výkonem**CHEMICKÁ BEDERNÍ SYMPATEKTOMIE****Informující lékař:** _____

Vážený pane, vážená paní,
k léčebnému zákroku, který Vám nyní doporučujeme, je potřeba Vašeho souhlasu. Abyste se mohl/a rozhodnout, informujeme Vás tímto listem o cíli výkonu, jeho provedení i o případných možných komplikacích. Lékař, který zákrok navrhuje i lékař, který bude zákrok provádět, Vám v ústním pohovoru rád vysvětlí případné nejasnosti a odpoví na Vaše otázky.
Na závěr tohoto dokumentu budete požádán, abyste svůj případný souhlas s navrhovaným výkonem potvrdil vlastnoručním podpisem.

Proč doporučujeme chemickou bederní sympatektomii?

Chemická bederní sympatektomie se provádí v případech závažných poruch prokrvení dolních končetin. Aplikace léčebné směsi injekcí přes kůži na zádech je pro pacienta mnohem šetrnější než operace, není třeba celkové anestezie, zkracuje se doba léčení, léčebné výsledky jsou přitom obecně velmi dobré.

Zlepšení stavu pacienta bývá často patrné téměř okamžitě po výkonu.

Jak se zákrok provádí?

Výkon se provádí nalačno, jiná příprava není nutná.

V poloze na břicho se provede pod CT zaměření místa aplikace léčebné směsi alkoholu, znečítlivující látky a kontrastní látky. Poté se zavede přes kůži dlouhá jehla z pravé nebo levé bederní krajiny do určeného místa a aplikuje se směs. Pacient okamžitě cítí pálivou bolest do břicha, která však v krátké době ustupuje. Vlastní prokrvení kůže nohou a celkové zahřátí následuje krátce po výkonu. Křeče v končetinách by měly být tímto výkonem utlumeny.

Doporučení po výkonu

Nejsou třeba žádná zvláštní opatření.

Jaké jsou možné komplikace výkonu?

Vzhledem k uložení cév před bederní páteří a značné vzdálenosti od místa vpichu je manipulace s jehlou vzhledem k těmto orgánům hůře kontrolovatelná a může dojít k napíchnutí aorty nebo dolní žíly. V obou případech se jehla vytáhne zpět a krvácení ustává. Výkon se někdy přeruší nebo odloží o 24 hodin. Propíchnutí tenkého střeva nebo parenchym ledviny nepřináší vážnější komplikace a nevede k přerušení výkonu. K výkonu se používá ultra tenká jehla, která brání vážnějším komplikacím při vpichu. Při průniku léčebné směsi více k hlavě, mohou být pozorovány krátkodobé poruchy s močením. Při správném provedení výkonu je výskyt závažnějších komplikací zanedbatelný!

Doplňující dotazy: Pokud některým informacím plně nerozumíte, neváhejte se znovu zeptat ošetřujícího lékaře. Vaše doplňující dotazy:

.....
.....

Souhlas pacienta

Prohlašuji, že se mnou lékař/lékařka provedl/a pohovor, při kterém mne vyčerpávajícím způsobem seznámil/a s plánovaným výkonem – **chemická bederní sympatektomie**, riziky i případnými komplikacemi (jinými možnými postupy). Všem informacím jsem rozuměl/a a měl/a jsem též dostatek času si vše rozvážit. Měl/a jsem možnost položit lékaři doplňující dotazy, které mne v souvislosti s výkonem zajímaly. Pokud tomu tak bylo, byly mi dostatečně zodpovězeny. Nezatajil jsem žádné skutečnosti týkající se zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na úspěch zákroku.

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM * s uvedeným výkonem

V Pelhřimově dne:

Podpis pacienta:

Jméno a podpis zákonného zástupce:
(u pacientů nezletilých nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům)

Podpis lékaře:

* *nehodící se škrtněte*

Prohlášení svědka

(v případě, že pacient souhlasí / nesouhlasí, ale nemůže se podepsat)

Jméno svědka:

Prohlašuji, že pacient přede mnou projevil, že po poskytnutém poučení **souhlasí / nesouhlasí** * s výkonem včetně všech jednotlivých výše uvedených prohlášení.

Pacient se nemůže podepsat z důvodu, že:

Pacient projevil svůj *souhlas / nesouhlas* * tak, že:

.....